



Haarraubwild

# Die kniffligsten Fragen

Die Aufgaben hat wie immer unser langjähriger Mitarbeiter sowie Jungjägerausbilder und -prüfer ANDREAS DAVID zusammengestellt. Heute geht es um das Fortpflanzungsverhalten des Haarraubwildes. Auf Wunsch vieler Leser finden Sie die Lösungen unten rechts.

1. Welche Art hat eine verlängerte Tragzeit?
  - a) Baummararder
  - b) Dachshund
  - c) Steinmararder
2. Kommt es zu Kreuzungen zwischen Baum- und Steinmararder?
  - a) Ja
  - b) Nein
  - c) Nur bei sehr geringen Wilddichten
3. Wie viele Welpen umfasst ein durchschnittlich starkes Steinmararderheck?
  - a) 1 bis 2
  - b) 3 bis 4
  - c) 7 bis 9
4. Welcher Wildhund erreicht durchschnittlich die höchste Welpenzahl?
  - a) Wolf
  - b) Mararderhund
  - c) Fuchs
5. Wann ranzt der Iltis?
  - a) März bis Mai
  - b) Juli bis August
  - c) November bis Januar
6. Bei welcher Art ist auch der Rüde mehr oder minder regelmäßig an der Welpenaufzucht beteiligt?
  - a) Iltis
  - b) Fuchs
  - c) Steinmararder
7. Welche Art lebt weitgehend monogam?
  - a) Mararderhund
  - b) Mauswiesel
  - c) Baummararder
8. Wann ist die Hauptranzzeit des Fuchses?
  - a) Januar/Februar
  - b) April/Mai
  - c) Juni/Juli
9. Bei welcher Art bleiben die Welpen am längsten im Familienverband?
  - a) Fuchs
  - b) Mararderhund
  - c) Wolf

Der Steinmararder ranzt vom Juli bis August. Wie viele Junge wirft er durchschnittlich?





Die Fuchswelpen werden etwa vier Monate von den Elterntieren versorgt. Wie lange jedoch dauert die ausschließliche Versorgung mit Muttermilch?

10. Bei welcher Art wird in der Regel nur ein Jungtier geboren?

- a) Dachs
- b) Fischotter
- c) Seehund

11. Wer ranzt überwiegend im Februar und März?

- a) Luchs
- b) Wildkatze
- c) Marderhund

12. Welcher Wildhund hat die kürzeste Tragzeit?

- a) Wolf
- b) Fuchs
- c) Marderhund

13. Wie viele Welpen umfasst ein durchschnittlich starkes Geheck des Waschbären?

- a) 2 bis 4
- b) 5 bis 7
- c) 7 bis 9

14. Wie lange führt eine Luchsin ihre Jungtiere?

- a) Etwa drei Monate
- b) Etwa fünf Monate
- c) Etwa neun bis zehn Monate

15. Die Tragzeit der Wildkatze umfasst durchschnittlich ...

- a) 54 bis 56 Tage
- b) 63 bis 66 Tage
- c) 78 bis 80 Tage

16. Wie viele Jungkatzen umfasst ein durchschnittlich starkes Geheck der Wildkatze?

- a) 3 bis 4
- b) 5 bis 7
- c) 7 bis 9

17. Wie hoch ist das Geburtsgewicht von Mauswieselwelpen?

- a) 1 bis 3 Gramm
- b) 10 bis 15 Gramm
- c) 25 bis 30 Gramm

18. Wessen Welpen werden nicht in gedeckten Verstecken (Höhlen etc.) geboren?

- a) Wolf
- b) Dachs
- c) Seehund

19. Die Tragzeit des Fischotters umfasst durchschnittlich ...

- a) 54 bis 56 Tage
- b) 60 bis 65 Tage
- c) 78 bis 80 Tage

20. Wessen Ranzzeit ist nicht an eine feste Jahreszeit gebunden?

- a) Fuchs
- b) Steinmarder
- c) Fischotter

21. Welcher Erd- oder Stinkmarder hat eine verlängerte Tragzeit?

- a) Mauswiesel
- b) Hermelin
- c) Iltis

22. Welche Arten werden schon im ersten Lebensjahr geschlechtsreif?

- a) Fischotter
- b) Hermelin
- c) Fuchs

23. Wie lange dauert die (reine) Sägezeit von Fuchswelpen?

- a) Etwa eine Woche
- b) Etwa 3 Wochen
- c) Etwa 2 Monate

24. Bei welcher Art kommt es zur Säuglingsträchtigkeit?

- a) Dachs
- b) Großes Wiesel
- c) Fischotter

25. Wann endet die Eiruhe beim Baumwilder?

- a) April/Mai
- b) September/Oktober
- c) Januar/Februar

Lösungen: 1 a, b und c; 2 b; 3 b; 4 b; 5 a; 6 b und c; 7 a; 8 a; 9 c; 10 c; 11 a, b und c; 12 b; 13 a; 14 c; 15 b; 16 a; 17 a; 18 c; 19 b; 20 c; 21 b; 22 b und c; 23 b; 24 b; 25 c

ASCHE STEIN & GLOCKEMANN  
Rechtsanwälte Steuerberater

Spezialbereiche: **Jagdrecht - Waffenrecht**

Ihr Ansprechpartner: Dr. Florian Asche

Neuer Wall 54 · 20354 Hamburg · Tel. 0 40 / 4 13 44 10 · Fax 0 40 / 41 34 41 29